

核准日期：2006年12月11日

修改日期：2010年11月26日

修改日期：2020年12月01日


# 瑞香素胶囊说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用。

1. 手术后有出血倾向患者禁用。
2. 肝肾功能不全患者禁用。
3. 严重高血压患者禁用。
4. 孕妇及哺乳期妇女禁用。
5. 对本品过敏者禁用。

**【药品名称】**通用名称：瑞香素胶囊  
英文名称：Daphnetin Capsules  
汉语拼音：Ruixiangsu Jiaonang

**【成份】**本品主要成份为瑞香素，化学名称：7,8-二羟基香豆素。化学结构式：



分子式： $C_9H_6O_4$

分子量：178.14

**【性状】**本品为硬胶囊剂，内容为类白色或灰白色粉末；无臭，无味。

**【适应症】**用于血栓闭塞性脉管炎及其他闭塞性血管疾病和冠心病的辅助治疗。

**【规格】**0.15g

**【用法用量】**口服。一次0.45g，一日3次。

**【不良反应】**偶有口干，手热感。

**【禁忌】**1. 手术后有出血倾向患者禁用。2. 肝肾功能不全患者禁用。3. 严重高血压患者禁用。4. 孕妇及哺乳期妇女禁用。5. 对本品过敏者禁用。

**【注意事项】**尚不明确。

**【孕妇及哺乳期妇女用药】**孕妇及哺乳期妇女禁用。

**【儿童用药】**本品未进行该项实验且无可靠参考文献。

**【老年用药】**本品未进行该项实验且无可靠参考文献。

**【药物相互作用】**维生素K对本品有拮抗作用。

**【药物过量】**本品未进行该项实验且无可靠参考文献。

**【药理毒理】**1、药理 瑞香素具有扩张冠状血管，增加冠脉血流量，减少心肌耗氧量，改善心肌代谢促进心功能恢复，扩张末梢血管以及抗动脉血栓形成和抑制血小板凝集作用；并有兴奋垂体-肾上腺皮质系统的抗炎作用。  
2、毒理 小鼠灌胃的 $LD_{50}$ 为5.37g/kg，亚急性毒性实验表明瑞香素对实验动物的心、肝、脾、肺、肾均无明显毒性。

**【药代动力学】**瑞香素吸收后在体内分布较广，其中以肾最高，其次为肺、脾、血浆，主要排泄途径为肾。

**【贮藏】**遮光，密封，在干燥处保存。

**【包装】**药用PVC硬片、药品包装用铝箔，12粒×2板/盒。

**【有效期】**暂定24个月

**【执行标准】**国家药品标准WS-10001- (HD-1123) -2002

**【批准文号】**国药准字H22024043

**【药品上市许可持有人/生产企业】**吉林省西点药业科技发展股份有限公司

**【注册地址/生产地址】**吉林省磐石经济开发区西点大街777号

**【邮政编码】**132300

**【电话号码】**0432-65888277

**【传真号码】**0432-65888299